

# *Elseya novaeguineae*

## **Tassonomia**

Regno: Animalia

Phylum: Chordata

Classe: Reptilia

Ordine: Testudines

Sottordine: Pleurodira

Famiglia: Chelidae

Genere: *Elseya*

Specie: *Elseya novaeguineae*

Questa Specie non presenta Sottospecie

## **Origini ed Habitat**

È distribuita in tutta la Nuova Guinea, Papua e introdotta nell'isola di Palau. Vive nei piccoli e medi corsi d'acqua, fiumi, acquitrini, stagni, paludi costiere predilige acque a corso lento con fondale sabbioso o melmoso.

## **Caratteristiche**

*Elseya novaeguineae* può raggiungere mediamente i 30 cm di lunghezza carapace. Il carapace di forma abbastanza idrodinamica si presenta tondeggiate ed appiattito leggermente più stretto nella parte anteriore; il piastrone ha colorazione chiara che si avvicina molto al giallo crema più intensa negli esemplari giovani ed è composto da 13 scuti. La colorazione della carnagione è grigia la parte inferiore del collo e degli arti è giallo, sul capo è presente una larga scaglia cornea. Negli individui adulti sono presenti due barbigli sul mento.

## **Dimorfismo e riproduzione**

Il dimorfismo sessuale non è particolarmente accentuato e si evidenzia soprattutto dalla conformazione della coda: i maschi hanno la coda lunga, tozza e con la cloaca in prossimità della punta; diversamente le femmine presentano una coda più piccola e corta, con cloaca posta vicino al piastrone. Dopo la copula la femmina nidifica una sola volta all'anno deponendo da 5 a 20 uova. Non sono presenti ulteriori dati sull'incubazione.

## **Allevamento**

Nonostante il suo nome comune "azzannatrice della Nuova Guinea" non è così mordace, tuttavia potrebbe essere molto aggressiva e territoriale se allevata in compagnia di altri maschi della stessa specie. Necessita di un ampio spazio acquatico poiché è un'abile nuotatrice. Questa deve essere dotata di zona emersa, con relativo spot e lampada UV, che viene abbastanza usata dagli esemplari adulti. L'acqua deve essere ben filtrata al fine di evitare gravi patologie cutanee e oculari. Mediante un termo riscaldatore per acquari l'acqua deve mantenere una

temperatura sui 24-26°C. Questa specie non iberna poiché nei luoghi di origine le temperature rimangono costantemente alte, tuttavia nei mesi estivi può essere allevata in laghetto alle nostre latitudini mentre in inverno è obbligatorio ritirarla all'interno di strutture riscaldate.

## **Alimentazione**

Specie prevalentemente carnivora.

Si adatta molto bene alla vita in cattività manifestando fin da subito la sua indole opportunistica. In cattività possiamo offrire principalmente pesci, molluschi, crostacei, insetti acquatici e se accettati vegetali, piante e frutta.

Soffre molto la fame ma non deve essere alimentata eccessivamente.

## **Legislazione**

È una specie non ritenuta a rischio, quindi è di libera vendita.

A cura di: Daniele Guarnotta





Foto: Daniele Guarnotta